

SLEDAI-2K

Kryterium włączenia do programu lekowego: wartość SLEDAI-2K ≥ 6 , w tym wartość klinicznego SLEDAI-2K ≥ 4 .
Do SLEDAI-2K uwzględniane są objawy z ostatnich 10 lub 30 dni.

Wartość SLEDAI-2K	Nazwa objawu	Definicja objawu
8	Napad padaczkowy	Niedawny przypadek. Należy wykluczyć objawy spowodowane zaburzeniami metabolicznymi, zakażeniami, lekami.
8	Psychoza	Zmieniające się zdolności funkcjonowania w normalnej aktywności spowodowane ciężkimi zaburzeniami w postrzeganiu rzeczywistości.
8	Organiczne uszkodzenie mózgu	Zmiana funkcji umysłowych z osłabioną orientacją, pamięcią lub innymi funkcjami intelektualnymi.
8	Zaburzenia wzroku	Zmiany w siatkówce.
8	Zaburzenia nerwów czaszkowych	Nowy przypadek neuropatii czuciowej lub ruchowej dotyczącej nerwów czaszkowych.
8	Toczniowy ból głowy	Silny, uporczywy ból głowy, który może być migrenowy, ale nie ustępujący po narkotycznych lekach przeciwbólowych.
8	Udar naczyniowy mózgu	Nowy przypadek udaru naczyniowego mózgu. Należy wykluczyć miażdżycę.
8	Zapalenie naczyń	Owrzodzenie, zgorzel, bolesny guzek palca, zawał okołopaznokciowy, linijny krwotok pod paznokciowy lub zapalenie naczyń rozpoznane na podstawie biopsji lub angiogramu.
4	Zapalenie stawów	Co najmniej 2 stawy z bólem i cechami zapalenia (tkliwość, obrzęk lub wysięk).
4	Zapalenie mięśni	Ból/osłabienie siły mięśni proksymalnych związane z podwyższoną aktywnością kinazy kreatynowej/aldolazy lub ze zmianami w elektromiogramie lub biopsji wskazującymi obecność zapalenia mięśni.
4	Wąteczki w moczu	Ziarniste (hemoglobinowe) lub erytrocytowe.
4	Krwinkomocz	W badaniu osadu moczu >5 krwinek czerwonych w polu widzenia. Należy wykluczyć kamicę, infekcje i inne przyczyny.
4	Białkomocz	$> 0,5$ g/24 godz.
4	Ropomocz	W badaniu osadu moczu >5 leukocytów w polu widzenia. Należy wykluczyć infekcje.
2	Wysypka	Wysypka typu zapalnego.
2	Łysienie	Nienaturalna, plackowata lub rozsiana utrata włosów.
2	Owrzodzenia śluzówek	Owrzodzenia w jamie ustnej lub w nosie.
2	Zapalenie opłucnej	Ból opłucnowy z tarciem opłucnej lub wysiękiem lub pogrubienie opłucnej.
2	Zapalenie osierdzia	Ból osierdziowy z towarzyszącym przynajmniej 1 z następujących objawów: tarcie, wysięk lub potwierdzenie w elektrokardiogramie lub echokardiogramie.
2	Niskie stężenie dopełniacza*	Zmniejszona aktywność hemolityczna dopełniacza CH50 lub zmniejszone stężenie składowych dopełniacza C3 lub C4.
2	Zwiększone wiązanie DNA*	Powyżej normy dla testów laboratoryjnych.
1	Gorączka	$> 38^{\circ}\text{C}$. Należy wykluczyć zakażenie.
1	Trombocytopenia	$< 100\ 000/\text{mm}^3$.
1	Leukopenia	$< 3000/\text{mm}^3$. Należy wykluczyć przyczyny polekowe.

Opracowano na podstawie raportu: Stajszczyk M., Majdan M., Kwiatkowska B., Batko B., Samoborski W. Toczeń Rumieniowaty Układowy w Polsce. Medyczne i Społeczne Aspekty Choroby oraz Strategia Leczenia. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Warszawa 2023; za: Gladman D.D., Ibanez D. i Urowitz M.B. Systemic lupus erythematosus disease activity index 2000. *The Journal of Rheumatology* 2002; 29 (2): 288-291.

* Niewliczone do klinicznego SLEDAI-2K.

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r.

