

INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWEGO WSTRZYKIWACZA PRALUENT TYPU PEN

Wizualne i dźwiękowe potwierdzenie wykonania wstrzyknięcia


Okienko kontrolne zmienia kolor na żółty, co stanowi wizualne potwierdzenie zakończenia wstrzyknięcia

Słyszalne kliknięcia informują o rozpoczęciu i zakończeniu zastrzyku

Aktywacja wstrzyknięcia następuje bez potrzeby korzystania z przycisku – wystarczy nacisnąć i przytrzymać wstrzykiwacz przy skórze

W żółtej osłonie znajduje się ukryta igła

Niebieska nasadka ze strzałką wskazującą kierunek wstrzyknięcia



ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA ZE WSTRZYKIWACZA PRALUENT

Przepisano Ci lek PRALUENT w celu obniżenia stężenia cholesterolu LDL, zwanego również LDL-C, we krwi.¹ W tej broszurze znajdziesz przydatne informacje na temat swojego nowego leku, w tym instrukcje krok po kroku, jak wstrzykiwać PRALUENT sobie lub komuś innemu. Przed wstrzyknięciem leku PRALUENT zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania oraz instrukcją użycia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących leku lub sposobu korzystania ze wstrzykiwacza PRALUENT zwróć się do opiekującego się Tobą pracownika opieki zdrowotnej.

INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA¹

Ogrzej wstrzykiwacz:

Najpierw wyjmij wstrzykiwacz z lodówki i odczekaj 45 minut, aż ogrzeje się do temperatury pokojowej.

W trakcie oczekiwania sprawdź następujące elementy wstrzykiwacza PRALUENT:

- Dawka jest zgodna z podaną na receptę
- Wstrzykiwacz nie jest uszkodzony
- Niebieska nasadka jest bezpiecznie umieszczona
- Płyn widoczny w okienku jest przezroczysty i bezbarwny lub bladożółty

Przygotuj dodatkowe przedmioty potrzebne do wykonania wstrzyknięcia:


- Chusteczki nasączone alkoholem do oczyszczenia obszaru skóry, gdzie planowane jest wstrzyknięcie
- Wacik lub gaza do zatamowania ewentualnego krwawienia po wstrzyknięciu
- Odporny na przebicie pojemnik do utylizacji zużytego wstrzykiwacza

Nie używaj wstrzykiwacza PRALUENT, jeśli został upuszczony na twardą powierzchnię.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy ze wstrzykiwaczem PRALUENT, poinformuj o tym opiekującego się Tobą pracownika opieki zdrowotnej. Nie próbuj używać wstrzykiwacza, co do którego istnieje podejrzenie, że działa nieprawidłowo.

Wybierz odpowiednie miejsce wstrzyknięcia:


Jeśli samodzielnie wstrzykujesz sobie PRALUENT, możesz wykonać wstrzyknięcie w górną część uda lub brzuch (z wyjątkiem obszaru 5 cm wokół pępka). Jeśli wstrzyknięcie wykonuje ktoś inny, można je podać do zewnętrznej strony ramienia. Za każdym razem należy wstrzykiwać w inne miejsce. Wstrzykuj tylko w odsłoniętą skórę, nigdy przez ubranie.




INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WSTRZYKIWANIA¹

Wstrzykiwacz PRALUENT jest dostępny w dwóch dawkach (150 mg i 300 mg). Oznacza to, że niezależnie od dawki można postępować zgodnie z tymi samymi instrukcjami wstrzykiwania. Pracownik opieki zdrowotnej poinstruuje Cię, jak często należy wstrzykiwać PRALUENT.


Przed wstrzyknięciem zawsze umyj ręce wodą z mydłem i osusz je ręcznikiem, a następnie użyj chusteczki nasączonej alkoholem do oczyszczenia wybranego miejsca wstrzyknięcia. Wstrzyknięcie można wykonywać w pozycji stojącej lub siedzącej.




Zdejmij niebieską nasadkę, ale nie dotykaj żółtej osłony igły.




Przyłóż osłonę igły do skóry pod kątem 90°. Ściśnięcie skóry palcami może sprawić, że będzie ona bardziej napięta – jest to wymagane u dzieci w wieku poniżej 12 lat.




Naciśnij i przytrzymaj wstrzykiwacz przy skórze, aby wykonać wstrzyknięcie. Nasłuchuj kliknięcia sygnalizującego rozpoczęcie wstrzykiwania.



Spójrz na okienko kontrolne – zacznie ono zmieniać kolor na żółty. Nasłuchuj drugiego kliknięcia, które oznacza, że wstrzyknięcie zostało podane.



Zaczekaj, aż całe okienko zmieni kolor na żółty – oznacza to, że wstrzyknięcie zostało zakończone. Następnie odsuń wstrzykiwacz od skóry. Jeśli to konieczne, przyłóż wacik lub gazę.



Wyrzuć wstrzykiwacz i niebieską nasadkę do odpornego na przebicie pojemnika na ostre przedmioty.

DO CZEGO SŁUŻY PRALUENT?¹

PRALUENT jest lekiem przeznaczonym dla osób ze zbyt wysokim poziomem „złego” cholesterolu, znanego również jako LDL-C, we krwi. Obejmuje to osoby dorosłe z hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną dyslipidią, dzieci i młodzież w wieku 8 lat i starsze z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną oraz osoby dorosłe z wysokim poziomem cholesterolu i chorobą sercowo-naczyniową.

JAK DZIAŁA PRALUENT?¹

W wątrobie znajdują się specyficzne receptory, które usuwają „zły” cholesterol z krwi. Białko o nazwie PCSK9 (również występujące w wątrobie) może jednak zmniejszać liczbę tych receptorów, powodując, że poziom „złego” cholesterolu jest wyższy niż powinien. PRALUENT zawiera lek o nazwie alirokumab, który blokuje PCSK9. Blokując PCSK9, PRALUENT zwiększa liczbę dostępnych receptorów usuwających „zły” cholesterol, co obniża jego ilość we krwi.

JAK PRZECHOWYWAĆ PRALUENT¹

CO NALEŻY ROBIĆ:



**PRZECHOWYWAĆ W ORYGINALNYM OPAKOWANIU
W CELU OCHRONY PRZED ŚWIATŁEM**



**PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM
I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**



**PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE
W TEMPERATURZE OD 2°C DO 8°C**

W razie potrzeby pojedyncze wstrzykiwacze PRALUENT można przechowywać poza lodówką, w temperaturze poniżej 25°C przez maksymalnie 30 dni.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ:



**NIE ZAMRAŻAĆ ANI NIE PODGRZEWAC
WSTRZYKIWACZA PRALUENT**



**NIE WSTRZAŚĆ
WSTRZYKIWACZEM PRALUENT**



**NIE UŻYWAĆ
WSTRZYKIWACZA PRALUENT, JEŚLI BYŁ
ON PRZECHOWYWANY POZA LODÓWKĄ
PRZECZ PONAD 30 DNI**

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE¹

Choć nie u każdego one wystąpią, działania niepożądane są powszechne w przypadku większości leków. W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych podczas stosowania leku PRALUENT poinformuj o tym opiekującego się Tobą pracownika opieki zdrowotnej. Częstymi działaniami niepożądanymi są: zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk i ból/tkliwość w miejscu wstrzyknięcia. Inne działania niepożądane mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób, w tym objawy ze strony górnych dróg oddechowych lub symptomy takie jak ból gardła, katar, kichanie i swędzenie. Więcej informacji można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania.

Nie należy stosować leku PRALUENT, jeśli masz uczulenie na alirokumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w ulotce dołączonej do opakowania. W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej przerwij stosowanie leku PRALUENT i skontaktuj się z lekarzem.

Referencje: 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Praluent 10/2025